

Impfkalender für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Erkrankung	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren			
	2	3	4	11 - 14	15 - 23	5-6	9 - 17	ab 18	ab 60
Diphtherie	X	X	X	X		A	A	Alle 10 Jahre	
Wundstarrkrampf (Tetanus)	X	X	X	X		A	A		
Keuchhusten (Pertussis)	X	X	X	X		A	A		
Hepatitis B	X	X ^a	X	X			G		
Kinderlähmung (Polio)	X	X ^a	X	X			A		
Hämophilus influenzae	X	X ^a	X	X					
Masern				X	X				
Mumps				X	X				
Röteln				X	X				
Windpocken				X	X ^a		G		
Virusgrippe (Influenza)									S
Pneumokokken	X	X	X	X					S
Meningokokken				12 – 24 Monate					

A = Auffrischungsimpfung. Diese sollte möglichst nicht früher als fünf Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis.

G = Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen, die daran noch nicht erkrankt sind (Anamnese). Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes

S = Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfung

a = Herstellerangaben beachten, eventuell zweite Impfung erforderlich

Um die Zahl der Injektionen möglichst gering zu halten, sollten vorzugsweise Kombinationsimpfstoffe verwendet werden. Dabei sollten die Angaben des Herstellers zu den Impfabständen beachtet werden.